

Mustiolo

(*Suncus etruscus*, Savi 1822)

Codice: **455**

Corologia: **mediterranea**

Classe: **Mammalia**

Origine: **Autoctona**

Ordine: **Insectivora**

Compilatori: **AMORI G.**

Famiglia: **Soricidae**

Note: Struttura sociale = si forma un legame di coppia nel periodo riproduttivo ed i giovani sono tollerati a lungo all'interno del nido.

Fenologia unica

Irregolare ☐ Parziale ☐

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

STRUTTURA SOCIALE E SPAZIALE

Schema di attività: **Notturno**

Struttura sociale: **Individuale**

Territoriale ☐

Sovrapposizione intersessuale ☐

Sovrapposizione intrasessuale ☐

Min Med Max

Dimensione del gruppo:

Dimensione dell'home range:

Dist. percorsa in un ciclo di attività: m

Dist. percorsa in fase di dispersione: **200** m

RELAZIONE CON L'ACQUA

Esigenze particolari legate all'acqua ☐

Min Med Max

Dist. da acque temporanee: m

Dist. da acque permanenti: m

RELAZIONE CON L'ALTITUDINE

Min Min Opt Max Opt

Altitudine: **0** **0** **400** **700** m

RELAZIONE CON L'USO DEL SUOLO

Categoria CORINE land cover livello 3

Idoneità

1.1.1	Edificato urbano continuo	1
1.1.2	Edificato urbano discontinuo	2
1.4.1	Aree urbane verdi	1
1.4.2	Strutture di sport, tempo libero	1
2.1.1	Terre arabili non irrigate	2
2.2.1	Vigneti	1
2.2.2	Alberi e arbusti	1
2.2.3	Oliveti	1
2.3.1	Pascoli	1
2.4.1	Seminativi e colture arboree	1
2.4.2	Aree agricole a struttura complessa	1
2.4.3	Aree agricole interrotte da vegetazione naturale	1
3.2.1	Praterie naturali	3
3.2.2	Brughiere	3

PUNTEGGI DI IDONEITA' AMBIENTALE

0: non idoneo
1: bassa idoneità
2: media idoneità
3: alta idoneità

3.2.4	Aree di transizione cespugliato-bosco	2
3.3.3	Aree con vegetazione sparsa	2