

Nottola gigante

(*Nyctalus lasiopterus*, Schreber 1780)

Codice: **483** Corologia: **centrosudeuropea**
Classe: **Mammalia** Origine: **Autoctona**
Ordine: **Chiroptera** Compilatori: **AGNELLI P.**
Famiglia: **Vespertilionidae**

Note: Dimensione del gruppo = numero di femmine nella colonia riproduttiva
Non utilizzabile per estrapolazioni di densità di popolazioni.

Esigenze legate all'acqua: per mantenere il bilancio idrico è necessaria la presenza di acqua in un raggio di circa 2-5 Km dal rifugio utilizzato.

Tipologia prevalente nella scelta dei rifugi :dendrofilo (rifugio estivo),
dendrofilo (rifugio invernale)

Fenologia unica

Irregolare ☐ Parziale ☐

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

STRUTTURA SOCIALE E SPAZIALE

Schema di attività: **Notturno**

Struttura sociale: **In colonia**

Territoriale ☐
Sovrapposizione intersessuale ☐
Sovrapposizione intrasessuale ☐

Min Med Max
Dimensione del gruppo:
Dimensione dell'home range:
Dist. percorsa in un ciclo di attività:
Dist. percorsa in fase di dispersione:

RELAZIONE CON L'ACQUA

Esigenze particolari legate all'acqua ☒

Min Med Max
Dist. da acque temporanee:
Dist. da acque permanenti:

RELAZIONE CON L'ALTITUDINE

Min Min Max Max
Opt Opt
Altitudine: **0** **700** **1400** **2000** m

RELAZIONE CON L'USO DEL SUOLO

Categoria CORINE land cover livello 3

Idoneità

| | | |
|-------|--|---|
| 1.4.1 | Aree urbane verdi | 1 |
| 2.2.2 | Alberi e arbusti | 2 |
| 2.3.1 | Pascoli | 1 |
| 2.4.3 | Aree agricole interrotte da vegetazione naturale | 1 |
| 2.4.4 | Aree agro-forestali | 1 |
| 3.1.1 | Boschi di latifoglie | 3 |
| 3.1.2 | Foreste di conifere | 3 |
| 3.1.3 | Boschi misti | 3 |
| 3.2.1 | Praterie naturali | 1 |

PUNTEGGI DI IDONEITA' AMBIENTALE

0: non idoneo
1: bassa idoneità
2: media idoneità
3: alta idoneità

| | | |
|-------|---------------------------------------|---|
| 3.2.2 | Brughiere | 2 |
| 3.2.4 | Aree di transizione cespugliato-bosco | 2 |