

Toporagno nano

(*Sorex minutus*, Linnaeus 1766)

Codice: **449**

Corologia: **paleartica**

Classe: **Mammalia**

Origine: **Autoctona**

Ordine: **Insectivora**

Compilatori: **AMORI G.**

Famiglia: **Soricidae**

Note: Attività = la specie è attiva sia di giorno che di notte. Relativamente più diurna del toporagno comune (*Sorex araneus*).

Home range = l'intervallo di valori riportati si riferiscono a studi europei condotti in diversi ambienti (dune e praterie).

Fenologia unica

Irregolare ☐ Parziale ☐

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

STRUTTURA SOCIALE E SPAZIALE

Schema di attività: **Diurno**

Struttura sociale: **Individuale**

Territoriale ☒

Sovrapposizione intersessuale ☐

Sovrapposizione intrasessuale ☐

Min Med Max

Dimensione del gruppo:

Dimensione dell'home range: **530** **2E+03** mq

Dist. percorsa in un ciclo di attività: m

Dist. percorsa in fase di dispersione: **200** m

RELAZIONE CON L'ACQUA

Esigenze particolari legate all'acqua ☐

Min Med Max

Dist. da acque temporanee: m

Dist. da acque permanenti: m

RELAZIONE CON L'ALTITUDINE

Min Min Max Max
Opt Opt

Altitudine: **300** **400** **1700** **2000** m

RELAZIONE CON L'USO DEL SUOLO

Categoria CORINE land cover livello 3

Idoneità

2.3.1	Pascoli	1
2.4.1	Seminativi e colture arboree	1
2.4.3	Aree agricole interrotte da vegetazione naturale	1
2.4.4	Aree agro-forestali	1
3.1.1	Boschi di latifoglie	3
3.1.2	Foreste di conifere	1
3.1.3	Boschi misti	3
3.2.1	Praterie naturali	2
3.2.2	Brughiere	2
3.2.3	Vegetazione a sclerofille	2
3.2.4	Aree di transizione cespugliato-bosco	2
3.3.3	Aree con vegetazione sparsa	1

PUNTEGGI DI IDONEITA' AMBIENTALE

0: non idoneo
1: bassa idoneità
2: media idoneità
3: alta idoneità

3.3.4	Aree incendiate	1
4.1.1	Aree interne palustri	1
4.1.2	Torbiere	1