

Falco cuculo

(*Falco vespertinus*, Linnaeus 1766)

Codice: **275**

Classe: **Aves**

Ordine: **Falconiformes**

Famiglia: **Falconidae**

Note:

Corologia: **Eurosibirica**

Origine: **Autoctona**

Compilatori: **MONTEMAGGIORI A., BRUNELLI M.**

Fenologia migratrice

Irregolare ☐ Parziale ☐

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐

STRUTTURA SOCIALE E SPAZIALE

Schema di attività: **Diurno**

Struttura sociale: **Gregaria**

Territoriale ☐

Sovrapposizione intersessuale ☒

Sovrapposizione intrasessuale ☒

Min Med Max

Dimensione del gruppo:

Dimensione dell'home range:

Dist. percorsa in un ciclo di attività:

Dist. percorsa in fase di dispersione:

RELAZIONE CON L'ACQUA

Esigenze particolari legate all'acqua ☐

Min Med Max

Dist. da acque temporanee:

Dist. da acque permanenti:

RELAZIONE CON L'ALTITUDINE

Min Min Max Max
Opt Opt

Altitudine: m

RELAZIONE CON L'USO DEL SUOLO

Categoria CORINE land cover livello 3

Idoneità

| | | |
|-------|--|---|
| 1.2.4 | Aeroporti | 3 |
| 2.1.1 | Terre arabili non irrigate | 3 |
| 2.1.2 | Terre irrigate permanenti | 2 |
| 2.2.2 | Alberi e arbusti | 1 |
| 2.2.3 | Oliveti | 1 |
| 2.3.1 | Pascoli | 3 |
| 2.4.1 | Seminativi e colture arboree | 3 |
| 2.4.2 | Aree agricole a struttura complessa | 3 |
| 2.4.3 | Aree agricole interrotte da vegetazione naturale | 3 |
| 2.4.4 | Aree agro-forestali | 3 |
| 3.2.1 | Praterie naturali | 2 |
| 3.2.3 | Vegetazione a sclerofille | 2 |
| 3.2.4 | Aree di transizione cespugliato-bosco | 2 |
| 3.3.3 | Aree con vegetazione sparsa | 1 |
| 3.3.4 | Aree incendiate | 3 |

PUNTEGGI DI IDONEITÀ AMBIENTALE

0: non idoneo
1: bassa idoneità
2: media idoneità
3: alta idoneità

| | | |
|-------|-----------------------|---|
| 4.1.1 | Aree interne palustri | 1 |
| 5.1.1 | Corsi d'acqua | 1 |
| 5.1.2 | Corpi d'acqua | 1 |

Fenologia nidificante

Irregolare ☐ Parziale ☐

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURA SOCIALE E SPAZIALE

Schema di attività: **Diurno**

Struttura sociale: **Intermedia**

Territoriale ☐

Sovrapposizione intersessuale ☒

Sovrapposizione intrasessuale ☒

Min Med Max

Dimensione del gruppo:

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 8 |
|---|---|---|

Dimensione dell'home range:

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Dist. percorsa in un ciclo di attività:

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Dist. percorsa in fase di dispersione:

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

RELAZIONE CON L'ACQUA

Esigenze particolari legate all'acqua ☐

Min Med Max

Dist. da acque temporanee:

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Dist. da acque permanenti:

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

RELAZIONE CON L'ALTITUDINE

Min Min Max Max
Opt Opt Opt Opt

Altitudine:

| | | | |
|---|---|----|----|
| 0 | 0 | 50 | 50 |
|---|---|----|----|

 m

RELAZIONE CON L'USO DEL SUOLO

Categoria CORINE land cover livello 3

Idoneità

| | | |
|-------|--|---|
| 2.1.1 | Terre arabili non irrigate | 3 |
| 2.1.2 | Terre irrigate permanenti | 3 |
| 2.1.3 | Risaie | 1 |
| 2.2.1 | Vigneti | 1 |
| 2.2.2 | Alberi e arbusti | 1 |
| 2.2.3 | Oliveti | 1 |
| 2.3.1 | Pascoli | 3 |
| 2.4.1 | Seminativi e colture arboree | 3 |
| 2.4.2 | Aree agricole a struttura complessa | 2 |
| 2.4.3 | Aree agricole interrotte da vegetazione naturale | 2 |
| 2.4.4 | Aree agro-forestali | 1 |
| 3.2.1 | Praterie naturali | 2 |
| 3.2.2 | Brughiere | 2 |
| 3.2.3 | Vegetazione a sclerofille | 1 |
| 3.2.4 | Aree di transizione cespugliato-bosco | 1 |
| 3.3.3 | Aree con vegetazione sparsa | 2 |
| 3.3.4 | Aree incendiate | 2 |
| 4.1.1 | Aree interne palustri | 1 |
| 5.1.1 | Corsi d'acqua | 1 |
| 5.1.2 | Corpi d'acqua | 1 |

PUNTEGGI DI IDONEITA' AMBIENTALE

0: non idoneo
1: bassa idoneità
2: media idoneità
3: alta idoneità