

Ferro di cavallo di Blasius

(*Rhinolophus blasii*, Peters 1866)

Codice: **467** Corologia: **mediterraneo-arabico-etiopica**
 Classe: **Mammalia** Origine: **Autoctona**
 Ordine: **Chiroptera** Compilatori: **AGNELLI P.**
 Famiglia: **Rhinolophidae**

Note: Dimensione del gruppo = numero di femmine nella colonia riproduttiva
 Non utilizzabile per estrapolazioni di densità di popolazioni.

Esigenze legate all'acqua: per mantenere il bilancio idrico è necessaria la presenza di acqua in un raggio di circa 2-5 Km dal rifugio utilizzato.

Home range= distanza di spostamento all'interno dell'homerange (specie sedentaria) espressa in Km.

Tipologia prevalente nella scelta dei rifugi :
 troglofilo (rifugio estivo), troglofilo (rifugio invernale)

Fenologia unica

Irregolare ☐ Parziale ☐

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

STRUTTURA SOCIALE E SPAZIALE

Schema di attività: **Notturno**

Struttura sociale: **In colonia**

Territoriale ☐

Sovrapposizione intersessuale ☐

Sovrapposizione intrasessuale ☐

Min Med Max

Dimensione del gruppo: **200**

Dimensione dell'home range: **2** **5** km

Dist. percorsa in un ciclo di attività:

Dist. percorsa in fase di dispersione:

RELAZIONE CON L'ACQUA

Esigenze particolari legate all'acqua ☒

Min Med Max

Dist. da acque temporanee:

Dist. da acque permanenti:

RELAZIONE CON L'ALTITUDINE

Min Min Opt Max Opt

Altitudine: **0** **0** **300** **1000** m

RELAZIONE CON L'USO DEL SUOLO

Categoria CORINE land cover livello 3

Idoneità

2.2.2	Alberi e arbusti	1
2.2.3	Oliveti	1
2.4.3	Aree agricole interrotte da vegetazione naturale	1
2.4.4	Aree agro-forestali	1
3.1.1	Boschi di latifoglie	3
3.1.2	Foreste di conifere	2

PUNTEGGI DI IDONEITA' AMBIENTALE

0: non idoneo
 1: bassa idoneità
 2: media idoneità
 3: alta idoneità

3.1.3	Boschi misti	3
3.2.4	Aree di transizione cespugliato-bosco	2