

Coniglio selvatico

(*Oryctolagus cuniculus*, Linnaeus 1758)

Codice: **493**

Corologia: **ovestmediterranea**

Classe: **Mammalia**

Origine: **Alloctona europea**

Ordine: **Lagomorpha**

Compilatori: **TROCCHI V.**

Famiglia: **Leporidae**

Note: Dimensione del gruppo=dimensione di un gruppo familiare (valore minimo) , di una colonia di medio (valore medio) ed elevato numero di individui (valore massimo).

Fenologia unica

Irregolare ☐ Parziale ☐

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

STRUTTURA SOCIALE E SPAZIALE

Schema di attività: **Notturno**

Struttura sociale: **In colonia**

Territoriale ☐

Sovrapposizione intersessuale ☒

Sovrapposizione intrasessuale ☐

Min Med Max

Dimensione del gruppo:

Dimensione dell'home range: ha

Dist. percorsa in un ciclo di attività: m

Dist. percorsa in fase di dispersione: m

RELAZIONE CON L'ACQUA

Esigenze particolari legate all'acqua ☐

Min Med Max

Dist. da acque temporanee: m

Dist. da acque permanenti: m

RELAZIONE CON L'ALTITUDINE

Min Min Opt Max Opt

Altitudine: m

RELAZIONE CON L'USO DEL SUOLO

Categoria CORINE land cover livello 3

Idoneità

1.2.4	Aeroporti	2
2.1.1	Terre arabili non irrigate	3
2.1.2	Terre irrigate permanenti	3
2.1.3	Risaie	1
2.2.1	Vigneti	1
2.2.2	Alberi e arbusti	1
2.2.3	Oliveti	1
2.3.1	Pascoli	3
2.4.1	Seminativi e colture arboree	3
2.4.2	Aree agricole a struttura complessa	3
2.4.3	Aree agricole interrotte da vegetazione naturale	3
2.4.4	Aree agro-forestali	2
3.1.1	Boschi di latifoglie	1
3.1.3	Boschi misti	1

PUNTEGGI DI IDONEITA' AMBIENTALE

0: non idoneo
1: bassa idoneità
2: media idoneità
3: alta idoneità

3.2.1	Praterie naturali	3
3.2.2	Brughiere	3
3.2.3	Vegetazione a sclerofille	2
3.2.4	Aree di transizione cespugliato-bosco	3
3.3.1	Spiagge e dune	2
3.3.3	Aree con vegetazione sparsa	1
3.3.4	Aree incendiate	1